

## Bijlage 1

### SCHEDELLETSEL

#### Begripsbepaling

**Opdracht die gegeven wordt na letsel aan het hoofd om complicaties tijdig te signaleren.**

#### Uitvoering

1. Wekadvis geldt voor de eerste 24 uur na het trauma.
2. De eerste zes uur moet de cliënt ieder uur gecontroleerd worden, daarna iedere twee uur.
3. Spreek hem of haar aan. Vraag bijvoorbeeld naar de naam van cliënt en vraag waar hij of zij is. Houdt rekening met eventuele slechthorendheid!
4. Als dat niet direct lukt, raak cliënt dan aan of knijp hem/haar even.
5. Als de patiënt niet normaal reageert op uw vragen, neem dan direct contact op met de d.d. arts. De sufheid kan op een verslechtering van de toestand wijzen.
6. Bel ook direct als cliënt last heeft van forse hoofdpijn, aanhoudende misselijkheid of herhaald braken.
7. Vul na iedere controle EMV score in op lijst (bijlage 2 observatielijst schedelletsel).
8. Er mogen geen sedativa, slaapmiddelen of alcohol toegediend worden.
9. Enige pijnstiller die gebruikt mag worden is paracetamol.

## Bijlage 2

### OBSERVATIELIJST SCHEDELLETSEL

#### EMV score

#### FREQUENTIE ZIE WEKADVIES (BIJLAGE 1)

Uitvoering van de Glasgow Coma Scale in een EMV-score

#### Het openen van de ogen

- 4 - spontaan: ogen spontaan open
- 3 - op aanspreken: bij stellen van een vraag
- 2 - op pijn prikkel: na toedienen van een pijn prikkel
- 1 - niet: ogen blijven gesloten
- C - niet vast te stellen (zoals b.v bij een brilmematoom)

#### De motorische reactie

- 6 - gehoorzamen: het uitvoeren van opdrachten
- 5 - lokaliseren: het lokaliseren van de pijn prikkel
- 4 - terugtrekken: terugtrekken op een pijn prikkel
- 3 - abnormaal buigen: abnormaal buigen op een pijn prikkel
- 2 - strekken: abnormaal strekken op een pijn prikkel
- 1 - geen: geen reactie op een pijn prikkel
- P - paralyse

#### De verbale reactie

- 5 - georiënteerd: geeft juiste antwoorden
- 4 - verward: geeft onjuiste antwoorden
- 3 - inadequaat: geeft onsamenhangende antwoorden
- 2 - onverstaanbaar: maakt alleen geluiden
- 1 - geen: reageert niet
- T - tube of afasie

#### Let op!

Bij de EMV-score wordt altijd gekeken naar de beste reactie.  
Bij de motore reactie wordt altijd gekeken naar de beste reactie van de armen.  
Bij de motore reactie moet rekening gehouden worden met eventuele aanwezigheid van een parese/paralyse.  
De maximaal te behalen score bedraagt 15.

## OBSERVATIELIJST SCHEDELLETSEL

tijd	fensie	pols	EMV-score
			openen van de ogen
			motorische reactie
			verbale reactie
			EMVscore
			openen van de ogen
			motorische reactie
			verbale reactie
			EMVscore
			openen van de ogen
			motorische reactie
			verbale reactie
			EMVscore
			openen van de ogen
			motorische reactie
			verbale reactie
			EMVscore
			openen van de ogen
			motorische reactie
			verbale reactie
			EMVscore

## OBSERVATIELIJST SCHEDELLETSEL

OBSERVATIELIJST SCHEDELLETSEL				
<b>naam</b>				
<b>geb. datum</b>				
<b>datum</b>				
tijd	tensie	pols	EMV-score	
			openen van de ogen	
			motorische reactie	
			verbale reactie	
			EMVscore	
			openen van de ogen	
			motorische reactie	
			verbale reactie	
			EMVscore	
			openen van de ogen	
			motorische reactie	
			verbale reactie	
			EMVscore	
			openen van de ogen	
			motorische reactie	
			verbale reactie	
			EMVscore	
			openen van de ogen	
			motorische reactie	
			verbale reactie	
			EMVscore	
			openen van de ogen	
			motorische reactie	
			verbale reactie	
			EMVscore	